

多くの「タスク」をこなす中でも、絶対に見逃してはいけない症例②

◎白木 涼¹⁾日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院¹⁾

【症例②】

40歳代女性

3日前から左前腕と首に皮下出血を自覚した。近医を受診し、血小板数極低値のため当院へ紹介受診となった。体温 38.2℃と発熱を認め、頭痛と倦怠感あり。

【検査所見】

末梢血液検査：RBC $2.72 \times 10^6 / \mu\text{L}$, Hb 9.2g/dL, PLT $0.7 \times 10^3 / \mu\text{L}$, WBC $4.9 \times 10^3 / \mu\text{L}$ (Seg 61%, Lympho 32%, Mono 5%, Eos 1%, Baso 0%)、Reti 26‰, $7.0 \times 10^4 / \mu\text{L}$, IPF 6.6%

凝固検査：PT 10.3 秒, PT-INR 0.93, APTT 27.1 秒, フィブリノゲン 343.4mg/dL, AT 102.3%, FDP 11.00 $\mu\text{g}/\text{mL}$, Dダイマー 4.90 $\mu\text{g}/\text{mL}$

生化学検査：TP 6.38 g/dL, ALB 3.78 g/dL, CK 114 U/L, AST 30U/L, AST 12 U/L, LD(IFCC) 964U/L, ALP(IFCC) 42U/L, γ -GT 18 U/L, ChE 179U/L, AMY 66 U/L, CRN 0.76 mg/dL, T-bil 2.20 mg/dL, D-Bil 0.12 mg/dL, Ca 8.6 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 3.7 mmol/L, Cl 108 mmol/L, Fe 159 $\mu\text{g}/\text{dL}$, UIBC 145 $\mu\text{g}/\text{dL}$, CRP 0.34 mg/dL, フェリチン 669 ng/mL,

尿定性検査：pH 7.0, 潜血 (3+), 蛋白 (3+), 糖 (-), ケトン体 (1+), 白血球 (-), 亜硝酸塩 (-)

尿沈渣：赤血球 1-4 個/HPF, 白血球認めず, 扁平上皮 1-4 個/HPF